

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФИТОЛИЗИН®

Регистрационный номер: П N014807/01

Торговое название препарата
ФИТОЛИЗИН®

МНН или группировочное название: -

Лекарственная форма

Паста для приготовления суспензии для приема внутрь

Состав на 100 г препарата

Активные компоненты:

сгущенный экстракт смеси: золотарника европейского травы, хвоща травы, горца птичьего травы, пырея ползучего корневищ, лука репчатого шелухи, березы листьев, пажитника сенного семян, петрушки корней, любистока корней – 67,2 г (в пересчете на 100 % сухое вещество – не менее 8,06 г)

Вспомогательные вещества: апельсина сладкого масло, шалфея мускатного масло, мяты перечной масло, сосны обыкновенной масло, агар, этилпарагидроксибензоат, крахмал пшеничный, ванилин, глицерол, вода очищенная.

Описание

Паста мягкой консистенции зелено-коричневого цвета, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Диуретическое средство растительного происхождения

Фармакологические свойства

Оказывает мочегонное, противовоспалительное, спазмолитическое действие, способствует вымыванию песка и мелких конкрементов из мочевых путей, уменьшает кристаллизацию минеральных компонентов мочи.

Фармакокинетика: данные отсутствуют

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания мочевых путей, нефроуролитиаз (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, гломерулонефрит, фосфатный уролитиаз, возраст до 18 лет.

Применение препарата при беременности и лактации

В связи с отсутствием данных, касающихся тератогенного действия компонентов препарата, не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Взрослым назначают внутрь по одной чайной ложке (5 г) пасты, растворенной в 1/2 стакана теплой сладкой воды, 3-4 раза в день после еды.

Курс лечения: длительность терапии определяется врачом. Средний курс лечения составляет от 2 недель до 1,5 месяцев. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, иногда - тошнота.

При повышенной чувствительности к ультрафиолетовым лучам возможны явления фотосенсибилизации.

При появлении побочных эффектов препарат следует отменить.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В связи с мочегонным действием препарата следует учитывать возможность ускоренного выведения других, одновременно применяемых лекарственных средств.

Фитолизин® может усиливать действие:

- антикоагулянтов, нестероидных противовоспалительных препаратов;
- гипогликемических лекарственных средств;
- лекарственных средств, содержащих соли лития;
- ингибиторов моноаминоксидазы;
- пролонгировать действие пентобарбитала, парацетамола.

Фитолизин® может уменьшить всасывание лекарственных средств в тонком кишечнике, в том числе бета-каротина, альфа-токоферола.

Особые указания

Не следует применять препарат в случае появления отеков, вызванных недостаточностью функции сердца или почек.

Применение препарата не оказывает отрицательного влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в

том числе управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и т.п.).

Форма выпуска

Паста для приготовления суспензии для приема внутрь. По 100 г в тубы алюминиевые, покрытые внутри лаком. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО

ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски, Польша.

Производитель

Гербаполь Варшава ООО

05-800 Прушкув, ул. Олувкова 54, Польша.

Организация, принимающая претензии потребителей

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия

142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29

Телефон/факс: +7 (495) 702-95-03