

Пермиксон

Гексановый экстракт плодов пальмы ползучей

Хроническое воспаление —
недооцененный фактор развития ДГПЖ

Как определить пациентов с хроническим воспалением предстательной железы (ХВПЖ)?

➤ Диагностировать метаболический синдром (МС)

≥ трех факторов риска¹¹

- Висцеральное ожирение
- Гипертриглицеридемия
- Низкий уровень ЛПВП-холестерина
- Гипертония
- Гипергликемия / сахарный диабет II типа

➤ Оценить результаты УЗИ¹²

- Большой объем ПЖ¹²
- Кальцификация ПЖ²



ДГПЖ
и ХВПЖ

➤ Определить клинические симптомы¹²

- Симптомы наполнения (никтурия, ургентность, частота)^{12,13}
- Более тяжелые симптомы¹²



➤ Выявить пациентов с низким ответом на медикаментозную терапию ДГПЖ¹²

Пермиксон

Гексановый экстракт плодов пальмы ползучей

Уменьшает воспаление
Облегчает симптомы

- Нет противопоказаний (исключение: возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата)
- Нет лекарственных взаимодействий
- Не влияет на уровень ПСА¹⁴
- Можно принимать при хирургическом вмешательстве по поводу катаракты или сердечно-сосудистых заболеваний³
- Не вызывает гипотензию, головокружение и астению³
- Сохраняет половую функцию¹⁵: отсутствует ретроградная эякуляция³

Принимать
2 капсулы в день
не менее 3 месяцев



Торговое название: Пермиксон. МНН: Пальмы ползучей плодов экстракт. Показания: для лечения умеренных нарушений мочеиспускания, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Способ применения: внутрь по 1 капс. 2 раза в день во время еды. Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению (ПУ П. N012687/02).

1. Latif A. et al. Prostate. 2015; 75 (16) : 1857-67. 2. Nickel J. C. et al. Eur Urol 2008; 54 (6) : 1379-84. 3. De Nunzio C. et al. Inflammatory mediators in the development and progression of benign prostatic hyperplasia. Nat Rev Urol. 2016; 13 (10) : 613-26. 4. Robert G. et al. Euro Urol Suppl. 2009; 8 : 879-86. 5. Zlotta A. R. et al. Eur Urol. 2014; 66 (4) : 619-22. 6. Roehrborn C. G. AUA Meeting, 2005. 7. Gacci M. et al. BMC Urology, 2017; 17 : 22. 8. Gandaglia G. et al. BJU International, 2013; 112 : 432-41. 9. De la Taille A. European Urology Supplements, 2013; 12 : 116-22. 10. Инструкция по препарату Пермиксон. 11. Novara G. et al. Eur Urol Focus. 2016; 2 (5) : 553-561. 12. Pytel Y. A. et al. Advances in therapy. 2002; 19(6):297-306. 13. Zlotta A. R. et al. European Urology. 2005; 48(2), 269-276. 14. Alcaraz A. et al. Int Urol Nephrol. 2016; 48 (5) : 645-56.



Pierre Fabre

Только для медицинских и фармацевтических работников.
За информацией обращаться: ООО «Пьер Фабр», 119435, Москва, Саввинская наб., 15.
Тел.: +7 495 789 9533, www.pierre-fabre-russia.ru, e-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com.

* В соответствии с АНА/NHLBI, МС устанавливается при наличии 3 и более из перечисленных факторов: (1) Объем талии > 102 см, (2) триглицериды ≥ 1,7 ммоль/л (150 мг/дл), (3) ХС-ЛПВП < 1,03 ммоль/л (40 мг/дл), (4) артериальное давление ≥ 130/85 мм рт. ст., и (5) уровня глюкозы натощак ≥ 5,6 ммоль/л (100 мг/дл). Кроме того, все пациенты, получающие медикаментозное лечение для гипертонии, гипертриглицемии или низкого уровня ЛПВП-холестерина и все пациенты с установленным диагнозом сахарный диабет II типа, считаются подверженными этим факторам.

ДГПЖ

Доброкачественная гиперплазия
предстательной железы

ВОСПАЛЕНИЕ ПРОСТАТЫ:

НЕ ВАЖНО?
НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ?
НЕ ЛЕЧИТСЯ?

Пермиксон

Гексановый экстракт плодов пальмы ползучей

Уменьшает воспаление
Облегчает симптомы¹



Pierre Fabre



Доказанное тройное действие

Противовоспалительное действие²

Клиническое исследование для оценки противовоспалительного действия препарата Пермиксон в предстательной железе¹:

- Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое исследование в параллельных группах с использованием тамсулозина в качестве контроля.
- Проводилось в течение 3 месяцев при участии 206 мужчин с СНМП/ДГПЖ.
- Сбор первой порции мочи после пальцевого ректального исследования в 1-й и 90-й день, количественное определение мРНК 29 основных маркеров воспаления при ДГПЖ.



Антипролиферативное действие³

Антиандрогенное действие³

Пермиксон: эффективность признана ЕМА

Гексановый экстракт: Пермиксон

- Обладает уникальным составом и надежными клиническими данными. Классифицирован как признанный лекарственный препарат, который имеет большой опыт клинического применения в Евросоюзе с доказанной эффективностью и допустимым уровнем безопасности.⁴



Этанольные экстракты

- Классифицированы как «традиционно применяемые» препараты, которые используются на протяжении не менее 30 лет, из них не менее 15 лет в Евросоюзе, и предназначены для безрецептурного применения.⁵

Сверхкритические CO₂ экстракты

- Не включены.



«Экстракты одного и того же растения, произведенные в разных лабораториях, не обязательно обладают одними и теми же биологическими и клиническими свойствами. Более того, эффективность одного препарата не может быть экстраполирована на другие».⁶

Пермиксон

Гексановый экстракт плодов пальмы ползучей

Уменьшает воспаление
Облегчает симптомы

Улучшение повседневной жизни

Никтурия

- Достоверно снижается по сравнению с плацебо (ВРС 0,64; 95% ДИ, -0,98 — -0,31; p<0,001)

Оценка по шкале IPSS

- Сопоставимая эффективность с тамсулозином (ВРС 0,57; 95% ДИ, -0,27 — 1,42; p=0,18)
- В комбинации с тамсулозином более эффективен, чем монотерапия тамсулозина (ВРС 0,31; ДИ 95%: 0,13 - 0,48; p<0,01)

Скорость потока мочи (Qmax)

- Достоверно выше, чем в группе плацебо (ВРС 2,75; 95% ДИ, 0,57 — 4,93; p=0,01)
- Сопоставимая эффективность с тамсулозином (ВРС 0,02; 95% ДИ, -0,71 — 0,66; p=0,95)

Метаанализ NOVARA, 2016⁷:

- Метаанализ литературных источников включает исследования, в которых изучалась эффективность и безопасность препарата Пермиксон.
- 12 рандомизированных контролируемых исследований: 7 vs плацебо; 2 vs тамсулозин; 2 в комбинации с тамсулозином vs монотерапия тамсулозином; 1 vs финастерид.

Изменение предстательной железы через 24 месяца⁸

- IPSS: -5,33 баллов
- Qmax: +1,13 мл/с
- Объем простаты: -5,89 см³



«Мне не нужно вставать ночью так часто как раньше»



«Я больше не думаю о простате: мне уже лучше!»



«Мое лечение все еще эффективно»

Пермиксон

Гексановый экстракт плодов пальмы ползучей

Уменьшает воспаление
Облегчает симптомы

Улучшение повседневной жизни

Качество жизни

В клинических исследованиях

- Улучшение качества жизни +24,6% через 6 месяцев, +40,2% через 2 года⁹
- Сохранение качества сексуальной жизни⁹


В реальной жизни: QUALIPROST STUDY, 2016*¹⁰

- Эффективен так же, как другие типы терапии (монотерапия или комбинированная терапия)
- Меньшее количество побочных эффектов при приеме препарата Пермиксон


Частота всех побочных эффектов через 6 месяцев наблюдения



Пермиксон



5-АРИ



Альфа-блокаторы



«Наша жизнь каждый день становится лучше»

* Активное наблюдение: 8,9%; монотерапия 70,3% (альфа-адреноблокаторы, 5-АРИ, растительные препараты, из них 95,2% Пермиксон); комбинированное лечение: 20,8%. Данные исходно и через 6 месяцев.