



Лечение ГМП у пожилых пациентов

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМОВ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ¹

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕПАРАТОВ (FORTA)¹ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СНМП У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ



Пригодность пероральных препаратов для длительной терапии симптомов нижних мочевых путей у пожилых людей: результаты систематического обзора литературы и международного согласительного валидационного документа.

Матиас Олке (Matthias Oelke), Клаус Бехер (Klaus Becher), Дэвид Кастро-Диаз (David Castro-Diaz), Эммануэль Шартье-Кастлер (Emmanuel Chartier-Kastler), Майк Кирби (Mike Kirby), Адриан Вагг (Adrian Wagg), Мартин Велинг (Martin Wehling).

2014 г.

Резюме

Цель: В этом исследовании мы провели систематический анализ препаратов, которые часто применяются для лечения симптомов нижних мочевых путей (СНМП) у пожилых людей. На основании данных об эффективности, безопасности и переносимости мы разделили эти препараты на пригодные и непригодные для данной возрастной группы, используя классификационную систему FORTA (Fit fOR The Aged).

Методы. Для оценки эффективности, безопасности и переносимости препаратов, применяемых для лечения СНМП у гериатрических пациентов, был проведен систематический обзор научных работ. Мы проанализировали публикации о клинических исследованиях и инструкции по применению целого ряда препаратов на предмет их эффективности и безопасности у пожилых людей (≥ 65 лет). Наиболее часто используемые препараты отбирались на основании текущих данных о рецептурных назначениях. Междисциплинарная группа экспертов из разных стран оценивала отобранные лекарственные средства дельфийским методом.

Результаты. Мы выявили в общей сложности 896 публикаций по 16 препаратам; однако только в 25 из них были приведены конкретные данные или сообщалось о результатах клинических исследований с участием только гериатрических пациентов, что свидетельствует об отсутствии адекватного научного обоснования медикаментозной терапии СНМП у пожилых людей. Ни один из препаратов не был отнесен к классу FORTA A (рекомендуемые препараты). Только три препарата были отнесены к классу FORTA B (полезные): дутастерид, фезотеродин и финастерид. Большая часть препаратов была признана относящимися к классу FORTA C (сомнительные): дарифенацин, мирабегрон, оксипутинин пролонгированного высвобождения, силодозин, солифенацин, тадалафил, тамсулозин, толтеродин и трасопид. К классу FORTA D (препараты, которых следует избегать) были отнесены алфузозин, доксазозин, оксипутинин быстрого высвобождения, пропиверин и теразозин.

Заключение. Дутастерид, фезотеродин и финастерид были признаны полезными для лиц пожилого возраста, в том числе ослабленных (класс FORTA B). Однако большинство препаратов, в частности из группы α -блокаторов и антимускариновых препаратов, являются нежелательными для этой группы пациентов (класс FORTA D) или обладают сомнительной эффективностью/безопасностью (класс FORTA C).

ТОВИАЗ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ КЛАССА В ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГМП

Антимускариновые препараты



Товиаз фезотеродин

B

Оксибутинин с немедленным высвобождением активного вещества

D

Оксибутинин в низкой дозе/с пролонгированным высвобождением

C

Солифенацин

C

Толтеродин

C

Троспия хлорид

C

Бета3-агонисты

Мирабегрон

C

Лечение, подходящее для пожилых людей

- A** АБСОЛЮТНО ПОДХОДИТ
- B** БЛАГОПРИЯТНОЕ
- C** С ОСТОРОЖНОСТЬЮ
- D** НЕ ПОДХОДИТ

“ Фезотеродин – наиболее изученный антимускариновый препарат у пожилых людей (большое количество пациентов, клинические результаты которых подтверждают отсутствие негативного влияния на когнитивную функцию, благоприятный когнитивный профиль, отчетливый клинический эффект у пожилых людей). ”



Товиаз®

ВОСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ



**2 ЭФФЕКТИВНЫЕ
ДОЗЫ^{1, 2}**



Для оптимального
баланса
**эффективности
и переносимости**
у каждого
пациента^{2,3}

“ **Фезотеродин хорошо зарекомендовал себя у пациентов со значимыми сопутствующими заболеваниями и полипрагмазией.¹** ”

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ТОВИАЗ®

Торговое название: Товиаз®

МНН: Фезотеродин

Лекарственная форма: таблетки пролонгированного действия.

Состав: 1 таблетка пролонгированного действия содержит фезотеродина фумарат – 4 мг или 8 мг, что эквивалентно 3,1 мг или 6,2 мг фезотеродина.

Показания к применению

Симптоматическая терапия синдрома гиперактивного мочевого пузыря (частого мочеиспускания и/или императивных позывов на мочеиспускание, и/или императивного недержания мочи).

Противопоказания

Гиперчувствительность к арахису, сое или любому из компонентов препарата. Задержка мочи. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся замедленной эвакуацией содержимого желудка. Неконтролируемая закрытоугольная глаукома. Миастения gravis. Тяжелая печеночная недостаточность (класса С по классификации Чайлд-Пью). Совместный прием фезотеродина и мощных ингибиторов изофермента СYP3A4 пациентами с тяжелой или умеренным нарушением функции печени или почек. Язвенный колит, токсический мегаколон. Беременность и период лактации. Дети и подростки младше 18 лет.

Товиаз®, таблетки с пролонгированным высвобождением активного вещества, содержат лактозу. Поэтому данный препарат нельзя назначать лицам, страдающим редкими врожденными нарушениями обмена веществ: непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Побочное действие

Наиболее частые побочные реакции: сухость в полости рта, запор, сухость глаз и диспепсия. Перечень всех побочных эффектов представлен в полной версии инструкции по медицинскому применению.

Способ применения и дозы

Внутрь, независимо от приема пищи, проглатывая целиком, не разжевывая и запивая жидкостью.

Рекомендуемая начальная доза фезотеродина составляет 1 таблетка (4 мг) 1 раз в сутки. Доза может быть увеличена до 2 таблеток (8 мг) 1 раз в сутки в зависимости от индивидуального ответа на лечение. Максимальная рекомендуемая суточная доза составляет 8 мг.

Полный терапевтический эффект развивается в период между 2 – 8 неделями регулярного приема препарата. Таким образом, следует оценивать эффективность лечения через 8 недель терапии.

Подробная информация по дозированию у различных групп пациентов изложена в полной версии инструкции по медицинскому применению.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Перед применением необходимо ознакомиться с полной версией инструкции по применению препарата для медицинского применения.

По вопросам безопасности и качества препарата Товиаз обращайтесь в компанию Пайзер по телефону: +7 (495) 2875000

Дата версии: 11.07.2017

PP-TOV-RUS-0018 04.04.2019



Pierre Fabre

Только для медицинских и фармацевтических работников.

За информацией обращаться: ООО «Пьер Фабр»; 119435, Москва, Саввинская наб., 15.

Тел.: +7 495 789 9533, www.pierre-fabre-russia.ru, e-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com.