

Дапоксетин-СЗ

МНН: Дапоксетин
Форма выпуска: 30 мг №10

Фармакотерапевтическая группа:

Средство для лечения преждевременной эякуляции, ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС)

Быстро
усваивается

Быстро достигает
пиковой концентрации

Быстро
выводится

Показания к применению*:

Лечение преждевременной эякуляции у мужчин в возрасте от 18 до 64 лет

Способ применения и дозы*:

- Рекомендуемая начальная доза 30 мг
- Принимают за 1-3 часа до предполагаемого полового акта
- Максимальная рекомендуемая доза составляет 60 мг с приемом за 1-3 часа до полового акта
- Принимать не чаще 1 раза в сутки, независимо от приема пищи
- Внутрь. Таблетку следует проглатывать целиком, запивать полным стаканом воды

Взрослые 18+

Рекомендуемая
начальная доза 30 мг

1 раз в сутки

Дапоксетин-СЗ обладает быстрым фармакологическим действием (С_{max} 1-2 часа) - **можно принимать «по требованию»**

Короткий период полувыведения (Т_½ 1,5 часа) приводит к **меньшему числу побочных эффектов**

Не обладает накопительным эффектом

Дапоксетин одобрен для лечения пациентов с преждевременной эякуляцией **уже в 50 странах мира!**

* Из инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Дапоксетин-СЗ

Производится в соответствии с европейскими стандартами GMP



управляй своей стихией



Дапоксетин-СЗ

Препарат для лечения
преждевременной эякуляции

- для пациентов с преждевременной эякуляцией
- для мужчин, которые не удовлетворены уровнем контроля над эякуляцией и длительностью полового акта

Отпускается по рецепту. Имеются противопоказания, перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом

Северная
ЗВЕЗДА
www.ns03.ru