



Алкоголь
не влияет
на концентрацию
тадалафил*

12



9



3



6



Победитель в номинации
«Первый отечественный
дженерик тадалафил»**

Тадалафил-СЗ

Лекарственное средство
для лечения нарушений эрекции



Многообразие доступно!



● 5 мг - №14, 28, 30

● 20 мг - №4, 7, 8,10

*Способствует улучшению эрекции и повышает возможность
проведения полноценного полового акта**



5 мг - ежедневный прием
при урологических проблемах*



20 мг - однократный прием
по требованию*

* Из инструкции по медицинскому применению препарата Тадалафил-СЗ

**Бренд "Тадалафил-СЗ" по итогам 2018 года является победителем международной фармацевтической премии "Зеленый крест" в категории "Препарат года", номинация "Первый отечественный дженерик тадалафил"

Отпускается по рецепту. Имеются противопоказания, перед
применением необходимо ознакомиться с полной инструкцией.
Телефон горячей линии - 8 (800) 333-24-14

**Северная
ЗВЕЗДА**

www.ns03.ru

Тадалафил-СЗ

МНН: Тадалафил

1-я линия терапии эректильной дисфункции

Препараты из группы и ФДЭ-5 уменьшают тонус мышц детрузора, простаты и уретры, улучшают кровообращение в органах малого таза и снижают активность хронического воспаления в тканях железы и мочевого пузыря



Тадалафил - единственный препарат (МНН) из группы и ФДЭ-5, который сегодня рекомендован к применению в дозе 5 мг при ДГПЖ для лечения симптомов нарушения мочеиспускания.⁽¹⁾

Показания к применению:

Эректильная дисфункция

Симптомы нижних мочевых путей у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (для дозировки 5 мг).

Эректильная дисфункция у пациентов с симптомами нижних мочевых путей на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы (для дозировки 5 мг).

Способ применения и дозы:

Взрослые 18+

Рекомендуемая начальная доза

5 мг (ЭД, СНМП)

20 мг (ЭД)

курсом

по требованию

1 раз в сутки

Для приема внутрь.

Применение препарата Тадалафил-СЗ по показанию эректильная дисфункция (ЭД)

♂ Для пациентов с частой сексуальной активностью (более двух раз в неделю): рекомендованная частота приема – ежедневно, один раз в сутки 5 мг, в одно и то же время, вне зависимости от приема пищи. Суточная доза может быть снижена до 2,5 мг (1/2 таблетки 5 мг) в зависимости от индивидуальной чувствительности.

♂ Для пациентов с нечастой сексуальной активностью (реже двух раз в неделю): рекомендовано назначение препарата Тадалафил-СЗ в дозе 20 мг, непосредственно перед сексуальной активностью согласно инструкции по медицинскому применению препарата.

Максимальная суточная доза препарата Тадалафил-СЗ составляет 20 мг.

⁽¹⁾ Доброкачественная гиперплазия предстательной железы у взрослых. Клинические рекомендации. Российское общество урологов 2016.

Производится в соответствии с европейскими стандартами GMP