



Bionorica®

Лекарственный растительный препарат Канефрон® Н

Для лечения и профилактики острых и хронических рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей, а также мочекаменной болезни (МКБ)

- Способствует уменьшению болей и резей при мочеиспускании
- Уменьшает количество повторных обострений
- Способствует отхождению конкрементов и препятствует их образованию



Рег. уд.: П № 014244/01 от 24.01.2012,
П № 014244/02 от 10.01.2018

Канефрон® Н – растительный лекарственный препарат компании «Бιονорика СЕ» (Германия). **Формы выпуска:** капли для приема внутрь (флаконы, 100 мл), таблетки (по 60 таблеток в упаковке). **Состав:** 1 таблетка содержит измельченное лекарственное растительное сырье из: Herba Centaurii (травы золототысячника) – 18 мг, Levistici Radix (корня любистока лекарственного) – 18 мг, Folia Rosmarini (листья розмарина) – 18 мг. 100 г капель содержат: 29 г водно-спиртовой вытяжки из следующих видов лекарственного растительного сырья: Herba Centaurii (травы золототысячника) – 0,6 г, Levistici Radix (корня любистока лекарственного) – 0,6 г, Folia Rosmarini (листья розмарина) – 0,6 г. Содержание этанола: 16,0–19,5% (в объемном отношении). **Фармакотерапевтическая группа:** диуретическое средство растительного происхождения. **Фармакологическое действие:** комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает мочегонное, спазмолитическое, противовоспалительное, противомикробное действие. **Показания к применению:** препарат применяется в комплексной терапии при лечении хронических инфекций мочевого пузыря (цистита) и почек (пиелонефрита), при неинфекционных хронических воспалениях почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит), в качестве средства, препятствующего образованию мочевых камней (также после удаления мочевых камней). **Противопоказания:** повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 1 года – для раствора, до 6 лет – для таблеток). Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения. Алкоголизм (в том числе после антиалкогольного лечения) – только для раствора. Недостаточность лактазы, непереносимость лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, непереносимость фруктозы (только для таблеток). С осторожностью: при заболеваниях печени, черепно-мозговых травмах, заболеваниях головного мозга. Применение при беременности и в период грудного вскармливания: возможно только по назначению врача, в строгом соответствии с рекомендациями по применению и после оценки лечащим врачом соотношения риска и пользы. Взаимодействие с другими лекарственными средствами: комбинация с антибактериальными средствами возможна и целесообразна. Взаимодействие с другими лекарственными средствами на настоящий момент неизвестно. **Способ применения и дозы:** взрослым – по 50 капель или по 2 таблетки 3 раза в день, детям школьного возраста – по 25 капель или 1 таблетке 3 раза в день, детям дошкольного возраста (старше 1 года) – по 15 капель 3 раза в день. После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение препаратом в течение 2–4 недель. Таблетки проглатывать целиком. Капли для смягчения вкуса можно принимать вместе с другими жидкостями. При необходимости лечение можно проводить курсами. **Побочное действие:** возможны аллергические реакции. Возможны расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). При появлении признаков аллергических реакций следует прекратить прием препарата.

Формы выпуска

Способ применения и дозы

Капли



Канефрон® Н, раствор для приема внутрь

Дети от 1 года до 6 лет: по 15 капель 3 раза в день
Дети школьного возраста: по 25 капель 3 раза в день
Взрослые: по 50 капель 3 раза в день

Таблетки



Канефрон® Н, таблетки*

Дети школьного возраста: по 1 таблетке 3 раза в день
Взрослые: по 2 таблетки 3 раза в день

* Таблетки, покрытые оболочкой.
После ослабления остроты заболевания лечение следует продолжать 2–4 недели.

ООО «Бιονорика»

Тел./факс: (495) 502-90-19 / www.bionorica.ru

Арт. 8224

Материал предназначен для врачей – участников конференции



Эффекты препарата Канефрон® Н¹



Любисток



Золототысячник



Розмарин

Нефропротективное и антиоксидантное действие

- Стабилизация клеточных мембран
- Уменьшение травматичности паренхимы

- Уменьшение вредного влияния ударной волны на почку

- Устранение почечных факторов литогенеза

Спазмолитический и диуретический эффект

- Более полное и раннее отхождение фрагментов камней

- Профилактика обтурации мочеточника и почечной колики
- Профилактика «каменной дорожки»

- Очистка мочевых путей от фрагментов камней, продуктов воспаления

Противомикробный и противовоспалительный эффект

- Снижение лейкоцитурии и бактериурии

- Профилактика острого и хронического пиелонефрита и других инфекционно-воспалительных осложнений

- Очистка мочевых путей от бактерий как зародышей кристаллизации

Стабилизация коллоидного состояния мочи

Уменьшение числа рецидивов МКБ

1. Давидов М.И., Игошев А.М. Роль фитотерапии в метафилактике мочекаменной болезни после дистанционной литотрипсии / Экспериментальная и клиническая урология, 2018, №4, ст. 1-8.