

Уро-Ваксом®

лиофилизированный лизат бактерий *Escherichia coli*⁵

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ (ИМП)
с наивысшим уровнем
доказательности и сильной
степенью рекомендаций – 1A^{1,6}

30
капсул

90
капсул



ПРОФИЛАКТИКА ИМП
3
МЕСЯЦА
1 ТАБЛЕТКА В ДЕНЬ⁵

- ✓ Способствует снижению количества обострений рецидивирующей инфекции мочевых путей на 93%²
- ✓ Эффективен в отношении не только *E. coli*, но также в отношении и других уропатогенов⁵
- ✓ Сокращает необходимость назначения антибиотиков в 2 раза через 6 месяцев лечения³
- ✓ Имеет хороший профиль безопасности, сопоставимый с плацебо⁴

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА УРО-ВАКСОМ®

Регистрационный номер: П N0154101. Торговое название: Уро-Ваксом®. Международное непатентованное или группировочное название: лиофилизированный лизат бактерий *Escherichia coli*. Лекарственная форма: капсулы. Показания для применения: Комбинированное лечение и профилактика рецидивов хронической инфекции мочевых путей, в особенности циститов, независимо от природы микроорганизма, в сочетании с антибиотиками или антисептиками у взрослых и детей с 4-х летнего возраста. Противопоказания к применению: Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Способ применения и дозы: Лечение: по 1 капсуле ежедневно утром натощак, запивая водой или другим напитком, в качестве дополнительного лекарственного средства при проведении обычной противомикробной терапии до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней. Максимальный срок лечения - 3 месяца. Профилактика рецидивов хронической инфекции мочевых путей: по 1 капсуле ежедневно утром натощак в течение 3 месяцев. В случае если ребенку трудно проглотить капсулу, ее следует открыть и смешать содержимое с питьем (фруктовый сок, молоко и т.д.). Длительность лечения или назначения повторного курса терапии должен определить врач, исходя из состояния здоровья больного. Меры предосторожности при применении: В случае возникновения кожных реакций, лихорадки или отека лечение должно быть прекращено, т.е. эти явления могут быть симптомами аллергической реакции. Использование в педиатрии: Эффективность и безопасность Уро-Ваксона не исследовалась у детей в возрасте младше 4-х лет. Побочное действие: Общее число нежелательных явлений в клинических исследованиях составило около 4%. В таблице ниже приводятся зарегистрированные побочные эффекты в зависимости от частоты их возникновения: нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: частые (от 1 до 10%) - диарея, тошнота, диспепсия; нечастые (от 0,1 до 1%) - боль в животе; нарушения со стороны нервной системы: частые - головная боль; нарушения общего состояния: нечастые - лихорадка; нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечастые - зуд, сыпь; нарушения со стороны иммунной системы: нечастые - реакции гиперчувствительности. Зарегистрированы единичные случаи серьезных негативных явлений, таких как отек полости рта и периферические отеки, а также развитие алопеции. При появлении кожных реакций, лихорадки (в случае изолированной или несильной лихорадки (выше 38 °C), возникающей в начале лечения) или отека лечение следует прекратить, так как данные симптомы могут быть признаками аллергической реакции. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: Иммуносупрессивное лечение снижает или полностью блокирует геральтический эффект Уро-Ваксона. Взаимодействия с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не установлено.

1. Опасный гриппозный вирус: *Infectious Diseases*, 2020. Европейское общество урологов. Рекомендации: инфекция в урологии, 2020. 2. Норман О.Б. и соавт. Рациональная терапия рецидивирующей инфекции нижних мочевыводящих путей. Результаты проспективной наблюдательной программы по оценке эффективности и безопасности применения препаратов Цифран® Солонга® и Уро-Ваксом® у пациентов с рецидивирующими неосложненными инфекциями нижних мочевых путей (IUDM). Урология, 2019; №4. 3. Schaffner CC et al. Oral immunotherapy of recurrent urinary tract infections. J Urol 1992; 150: 919-21. 4. Nabee KS, Cho YJ, Matsumoto T, et al. Immunotative prophylaxis of recurrent urinary tract infections: a study analysis. Int J Urol 2009; 32: 1119-5. Инструкция по медицинскому применению препарата Уро-Ваксом® (ИПФ-0154101 от 06.10.18). 6. Колические рекомендации МЗ РФ «Цистит бактериальный у взрослых» от 2019 года. Доступна на: <https://www.ocongs.ru/publications/R0U/F04/KP%20ЦИСТИТ%20МЗ%20РФ%20ИМ%202023.01.19-номерирован.рdf>. Дата обращения: 09.12.20.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АО «Астеллас Фарма», 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16. Тел. +7(495) 737-07-56. Факс +7 (495) 737-07-50

AI_2020_0012_RU_DEC_2020_POSTSCRIPTUM

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Реклама

 astellas